



D. O. M.

POSITIONES ANATOMICÆ

ET

CHIRURGICÆ.



PANARITIUM, digitorum affectio est quæ nec simplicior, nec complicatior, cujusque nec facilior nec operosior curatio. Discriminum hujusce morbi ratio, à partium, quas afficit; structurâ, officio & indole repetenda; id circè de extremitatis superioris anatome, ad Panaritorum curationem nécessaire, rationem reddere operæ pretium erit.

PANARITIUM, Græcis *παγογυρία*, quod in extremo digiti situm sit, morbus est inflammatorius, tumore majori minori - ve se se exhibens. Pro quadruplici hujusce tumoris sede, qua-

3

tuor paronichiarum species assignaverunt Chirurgiæ protomagistri.

PRIMA cutem leviter obsidet cum tumore, rubore, tensione, calore & dolore; secunda, cutem imò & membranam adiposam occupat, iisdem symptomatis, sed majoribus, dolore præsertim acutiori, stipata.

SÆPIUS in tendinum vaginis situm habet Panaritium, vix ullo aut planè nullo in extremo digiti concomite tumore: hujus-ce tertiæ speciei tanta mali sævities, ut nisi efficaciora artis suppeditentur auxilia, delirium, convulsiones accersat, miserrimosque tandem inter cruciatus animam æger exhalaturus sit.

PROFUNDIUS denique haud infrequenter situm est Panaritium, in ipso scilicet phalangæ periosteo, vel inter os & periosteum sine tumore, rubore, aut vix ullo; multum dolet æger, remissiùs tamen quàm in tertiâ specie.

PANARITIORUM causa proxima eadem est ac alterius cuiuslibet inflammationis; itaque exoritur nunc ab externis, pungentibus præcipuè, nunc verò à diathesi fluidorum acri & vitio quodam sæpiùs inquinatâ.

DIAGNOSIS ex præfatis deducenda.

TERTIA species periculosior est aliis ratione sedis & symptomatum tum essentialium, tum adventitiorum: pus vaginam inter & tendinem serpit, eorum substantiam vellicat, corrodit; hinc omnia expandescunt, fiuntque inflammationes, abscessus, uti in flexurâ cubiti, infra axillas, imò & gangræna.

PHALANGAM non rarò corrodit Panaritium quartæ classis, acerbissimum excitat dolorem, gravissimaque, si ad extrema venerit, accersit mala.

PARONICHIIARUM primæ & secundæ classis haud ardua curatio; resolutione aut brevi levique suppuratione facili negotio curantur: eas tamen, secundam potissimum, si congrua sit & citò

non adhibita fuerit therapeia, tertiam in speciem degenerasse observatum est.

A remediis tum internis tum externis, à scalpello denique paronichiarum instituenda curatio.

PARONICHIE cuticulam inter & cutem sedentis expedita Medicina: si sub epidermide puris adsit collectio educatur; tunc veluti sponte sua non nunquam sanescit.

SI sub ungue humoris stasim reperieris, & extollatur unguis ipse, eandem quâ sublevatur proportionem, subito pro re nata vel scindatur, vel secetur, & juxta praxim vulnus curetur.

SI profundius hæreat malum, cutemque imò & membranam adiposam afficiat, resolventium aut suppurantium ope sanetur.

SI propè articulum & extrà vaginam aperiendus tumor adsit; hunc, ad tendinis flexoris salutem, scapello, non verò causticis ut potè perniciosus, è latere aperiendum legitima docet praxis.

SI celebratæ operationi succedat hæmorrhagia idoneâ sistatur compressione.

PRO variis quæ sæviunt in tertiâ specie symptomatis, diversa medendi ratio: hinc si vividissimus ægrum dolor exagitet, si major adsit partis inflammatio, venæ sectiones plus minùs-ve repetere cataplasmata anodina, emollientia super imponere non procastinabit sciens Chirurgus.

SI mali non dessectat sævities, pessimis ægri rebus puris expectaretur confectio; citò debelletur tumor tendinis quæ vaginæ incisione.

SI super musculum quadratum reptans pinguedo in purem abierit, quàm citissimè aperiatur focus.

SI ob puris sub aponevrosi palmari effusionem; usquè ad principium tendo graviter afficiatur, ipsum-ve ligamentum annu-

4  
sare vitiatum fuerit, ad compescenda quæ ex inde sobolescent acci-  
dentia, utriusque sectio nonnunquam ineluctabilis.

A D fauciati aut detecti tendinis curationem, ab unctuosius di-  
ligenter abstinendum, sed ad balsamica recurrendum.

S I in periosteo sedem fixerit ichor, incisio in os usquæ inf-  
tutuenda: si verò carie corrosa phalanga reperiatur, hanc, præ-  
posterâ opitulandi sollicitudine, ferro non amputer Chirurgus;  
naturæ etenim beneficio, medicaminumque ad exfoliationem  
idoneorum energiâ curationis opus absolvi sinè ullâ seîdè defor-  
mitate haud rarò observavimus.

CÆTERUM, juxtâ praxim deligetur vulnus congruâque ob-  
firmetur fasciatione.

*Has positiones, DEO JUVANTE, & præside M. PETRO  
GENTI, Artium in almâ Universitate Parisiensi, &  
Chirurgiæ Magistro, nec non Scholarum præposito,  
perierit conabitur PETRUS FABRE, Avenionensis, Artium  
Liberalium Magister.*

P A R I S I I S,  
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

*Die Sabati 30<sup>ma</sup> Octobris 1751. à sesqui-secundâ post me-  
ridiem ad Septimam. Anno Domini 1751.*

P R O A C T U P U B L I C O

E T

M A G I S T E R I I L A U R E A.

---

Typis DELAGUETTE Regiæ Chirurg. Academiæ  
Typographi 1751.